

# Voorwaarden vergoeding van afslankmedicatie

Sinds kort is het mogelijk om vanuit de basisverzekering aan een bepaalde patiëntengroep de afslankmiddelen Saxenda® en Mysimba® voor te schrijven. In dit overzicht staan de voorwaarden op een rij waar patiënt aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding.

De afslankmedicijnen Saxenda® (Liraglutide) en Mysimba® (naltrexon icm bupropion) worden respectievelijk vanaf 1 juli en 1 augustus vergoed vanuit het basispakket. Absolute voorwaarde hierbij is dat er eerst is deelgenomen aan een erkende GLI en dat deze na één jaar deelname niet succesvol is gebleken.

## Saxenda®

### Wanneer kan er met Saxenda® (Liraglutide) worden gestart?

Wanneer er is gestart met een erkende GLI behandeling en deze na één jaar deelnemen niet succesvol is gebleken.

### Wanneer heeft patiënt recht op vergoeding van Saxenda®?

- 18+ en géén diabetes type 2.
- Bij deelname aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), zonder diabetes mellitus type 2 en die (nog) niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie met:
  - BMI  $\geq 35$  kg/m<sup>2</sup> in combinatie met een co-morbiditeit (hart- en vaatziekte, slaapapneu en/of artrose)
  - óf - BMI  $\geq 40$  kg/m<sup>2</sup>

De behandeling dient te worden gestaakt indien na drie maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen.

### Wanneer stopt de vergoeding van Saxenda®?

- Als na drie maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen. (Dit is ongeveer 16 weken na starten met Saxenda®).
- Na voortijdig stoppen aan het GLI-programma of bij onrechtmatig afwezig zijn of bij onvoldoende inzet.

De artsverklaring, apotheekinstructie (ZN-formulieren) en aanvullende informatie over Saxenda® [vindt u hier](#) op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

### **Toelichting**

Het middel Saxenda® kost ongeveer tussen de € 2.500,- en € 3.000,- per jaar. Zoals het er nu naar uitziet moet het middel chronisch gebruikt worden, dus dit moet ook goed toegelicht worden bij de patiënt.

## **Mysimba®**

### **Wanneer kan er met Mysimba® (naltrexon icm bupropion) worden gestart?**

Wanneer er is gestart met een erkende GLI behandeling en deze na één jaar deelnemen niet succesvol is gebleken.

### **Wanneer heeft patiënt recht op vergoeding van Mysimba®?**

- BMI  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup> of
- BMI 27 kg/m<sup>2</sup> tot 30 kg/m<sup>2</sup> in combinatie met een comorbiditeit ((risicofactoren voor) hart- en vaatziekte, diabetes mellitus type 2, slaapapneu en/of artrose).

De behandeling moet worden gestaakt als na vier maanden gebruik het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen.

**Meer informatie over Mysimba® [vindt u hier](#).**

